FAZOL

Antifongique local

Dans quel cas le médicament FAZOL est-il prescrit ?

Ce médicament d'action locale contient un antifongique de la famille des imidazolés.

Il est utilisé dans le traitement de certaines maladies de la peau et des muqueuses, dues à des champignons microscopiques (mycoses) : candidose, pityriasis versicolor, dermatophyties...

Présentations du médicament FAZOL

FAZOL 2 % : crème ; tube de 30 g

Remboursable à 30 % - Prix : 4,58 €.

FAZOL 2 % : émulsion fluide pour application locale ; flacon de 30 g

Remboursable à 30 % - Prix : 4,39 €.

FAZOL 2 % : poudre pour application locale ; flacon poudreur de 30 g

Remboursable à 30 % - Prix : 4,76 €.

Composition du médicament FAZOL

p 100 g

Isoconazole nitrate 2 g

Substance active : Isoconazole nitrate micronisé

Aucun excipient commun.

Contre-indications du médicament FAZOL

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie aux antifongiques de la famille des imidazolés.

Attention

Évitez d'utiliser ce médicament, notamment chez l'enfant, de manière prolongée et sur des surfaces étendues ou profondément lésées, sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

Rincez abondamment en cas de contact accidentel avec les yeux.

Fertilité, grossesse et allaitement

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

Mode d'emploi et posologie du médicament FAZOL

Le médicament doit être appliqué après lavage et séchage soigneux de la zone à traiter. Appliquer directement sur les lésions à traiter et masser pour faire pénétrer. Dans les plis de la peau, la crème doit être appliquée en petite quantité pour limiter le risque de macération.

Posologie usuelle :

2 applications par jour.

La forme utilisée et la durée du traitement varient selon les cas.

Conseils

En cas de candidose, évitez d'utiliser des savons acides : ils favorisent la multiplication des champignons.

En cas de lésion importante des ongles des orteils, un meulage préalable par un pédicure facilite l'action du médicament.

Une transpiration excessive contribue au développement des lésions dues à des champignons. Le port de chaussettes en fibre naturelle (coton, laine) est recommandé. La même paire de chaussures ne doit pas être portée deux jours de suite.

Effets indésirables possibles du médicament FAZOL

Rarement : irritation cutanée, réaction allergique.

Laboratoire Sinclair Pharma France